



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BOTOȘANI

Str. Eternității nr. 6, cod 710321
Loc. Botoșani, Jud..Botoșani

Telefon: 0231518227,
email:ofjbotosani@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr...21...din.....29.05.2018

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii **MANA TOMATELOR** (*Phytophthora infestans*) care poate cauza pierderi importante la culturile de TOMATE .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului 1.

Folosiți unul din **produsele** sau din amestecurile de mai jos , după caz :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - EQUATION PRO.....0,4 Kg / ha | <i>sau</i> |
| - BRAVO 500 SC1,5 – 2,0 L / ha | <i>sau</i> |
| - ANTRACOL 70WP.....0,20 % | <i>sau</i> |
| - FOLPAN 80 WDG.....0,15 % | <i>sau</i> |
| - SHAVIT F 72 WDG0,20 % | |

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST-EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro) .

Perioada optimă de tratament : 04.06 – 09.06.2018 ; Tratamentul se va repeta la 8 – 12 zile , în funcție de remanența produselor folosite .

Recomandări la executarea tratamentelor fitosanitare :

- În timpul tratamentului , pesticidele trebuie să ajungă numai pe suprafețele prevăzute a fi tratate .
RESPECTAȚI CU STRICTEȚE NORMELE DE LUCRU CU PRODUSELE DE PROTECȚIA PLANTELOR , PE CELE DE SECURITATE A MUNCII ȘI DE PROTECȚIE A ANIMALELOR .

Măsuri pentru protecția familiilor de albine :

Este interzisă aplicarea produselor de protecția plantelor , cu excepția celor atestate prin mențiunea că **NU SUNT TOXICE PENTRU ALBINE** .

Fermierii care execută acest tratament , au obligația să anunțe în scris, sub semnătură de luare la cunoștință , Primăria și deținătorii de stupine din raza teritorială a localității , despre locul , data începerii și mijloacele cu care se execută tratamentul cu produsele de protecția plantelor menționate .

Alte recomandări :

- Nu recoltați înainte de expirarea timpului de pauză pentru produsul folosit la tratament ;
- Produsele cu acțiune sistemică se aplică după apariția bolii sau preventiv la intervale de 10-15 zile;
- Produsele cu acțiune de contact se aplică la 8-10 zile ;
- Pentru stropiri alternați produsele sistemice cu cele de contact , pentru a preveni apariția rezistenței agentului de dăunare .

ANEXA:

ATENȚIONARE! Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice și juridice) **au obligația de a deține și completa la zi „Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, cerință obligatorie conform Ordinului 352 din 10.02.2015 pentru aprobarea normelor**